

GUIA

FITOSANITARIA PARA EL CULTIVO DE

MAÍZ



- 1** AGREGUE AGUA HASTA 1/4 DE LA CAPACIDAD DEL ENVASE
- 2** CIERRE EL ENVASE AGITE DURANTE 30 SEGUNDOS
- 3** VIERTA EL AGUA DEL ENVASE EN EL EQUIPO PULVARIZADOR

REPITA ESTE PROCEDIMIENTO **3 VECES**

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE”

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE AL

1800-VENENO (836366)
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HORAS



AGARISMAL S.A.
Mapasingue Este Av. Quinta 118 y calle primera.
Telf.: 04-511-1316 - Telf. Ventas: 04-503-8410
info@agarismalsa.com

@agarismalec www.agarismal.com

GUÍA PARA APLICACIÓN DE PRODUCTOS

CONTROL DE INSECTOS	CONTROL DE ENFERMEDADES
MAIZPRIM + Glifoton	
PRESEMBRA Hasta 4 días después de siembra	
KAMPRID (Lambda cihalotrina 100g/L+imidacloprid 150g/L) 250cc/Ha, 8-15 días después de germinado.	CHISPA (Difenoconazole 250g/L+Propiconazole 250g/L) 250cc/Ha, 45-55 días después germinado.
MIKCE	
8 días	
PRIUSS INSECTICIDA AGRICOLA	
15 días	
CHISPA FUNGICIDA	
20 días	
JOSTHIAN INSECTICIDA	
30 días	
JOSTHIAN (Tiazofos 400g/l, EC) 500cc/ranque	
35 días	
30-45 días	

HERBICIDAS

MAIZPRIM

(Atrazina 900g/kg)

Se aplica después de la siembra con suelo húmedo (sellante - mata semilla), controla malezas de hoja ancha hasta de 2-3 hojas verdaderas.

DOSIS: 1-1.5 funda de 900g/Tanque



Verdolaga



Amarantus



Nabo



Bolsita del pastor



Achochilla

SECAMAS

(Paraquat 276 g/L)

Controla todo tipo de malezas (herbicida no selectivo de contacto) se debe usar pantalla para su uso en el cultivo de maíz.

DOSIS: 2-3 litros / tanque



MAIZSULF

(Nicosulfuron 750g/kg)

Se aplica hasta los 18-20 días después de germinado, se debe consultar con el proveedor de semilla si el híbrido que va a sembrar es tolerante al MAIZSULF (Nicosulfuron). No se debe mezclar con insecticidas organofosforados.

DOSIS: 2 funditas de 16g /Tanque



Pata de gallina



Paja de patillo



Verdolaga



Bledo

Glifotran

(Glifosato 480g/L)

Elimina todo tipo de malezas (mata raíz, herbicida no selectivo de acción sistémica), por lo que se recomienda su aplicación al día siguiente de la siembra, puede mezclarse con MAIZPRIM.

DOSIS: 2-3 litros/Ha

INSECTICIDAS


PRIUS

INSECTICIDA AGRICOLA

(Lufenuron 50 g/L + Profenofos 5z00g/L)

Controla gusano cogollero, gusano ejército y gusano Helliotis. Aplicable en cualquier momento del cultivo que éste lo requiera.

DOSIS: 250cc / tanque



KMIKCE

(Lambda Cihalotrina 50g/L)

Para el control temprano del gusano cogollero (7-15 días de sembrado) cuando se observe los primeros daños en la planta de maíz (raspado).

DOSIS: 250cc/Tanque



KAMPRID

(Imidacloprid 150g/L + Lambda cihalotrina 100g/L)

Se lo recomienda para el control de la cigarrita transmisora de virus en el cultivo de maíz. Se aplica entre los 7 y 15 días del cultivo.

DOSIS: 250cc/Ha



JOSTHIAN

(Triazofos 400g/L)

Controla Gusano Cogollero, Gusano Ejército y Gusano Helliotis.

Se puede aplicar en cualquier momento del cultivo que éste lo requiera.

DOSIS: 250cc/Ha

FUNGICIDAS

CHISPA

(Propiconazole 250g/L + Difenconazole 250g/L)

Para la prevención y control de la mancha de asfalto.

Se lo utiliza a los 20 días de sembrado.

DOSIS: 250cc/Tanque



KASUINICO

(Acido oxolínico 200g/L + Kasugamicina 50g/L)

Para el control de Bacteriosis en el cultivo del maíz.

Se lo aplica al primer síntoma de pudrición bacteriana.

DOSIS: 250cc/Tanque

